



آزمایشگاه مرکزی فرديس
کلينیکال و اناتوميکال

بخش نمونه گیری

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه خلط

شماره فرم SCO-F-11

ویرایش: B

صفحه: ۱ از ۱

مستندات سیستم کیفیت، هر گونه کپی و تکثیر از این سند صرفاً توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره‌وری انجام خواهد شد.

لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

- ۱- نمونه خلط را فقط در ظرف آزمایشگاه جمع آوری نمایید.
- ۲- نمونه گیری را ترجیحاً قبل از استفاده از هر نوع آنتی بیوتیک انجام دهید.
- ۳- صبح پس از برخاستن از خواب مقداری آب نمک رقیق را در دهان خود قرقره نموده و دور بریزید.
- ۴- با یک نفس عمیق ریه‌ها را پر نموده و سپس با یک بازدم آن را خالی نمایید. همراه این عمل چند سرفه نسبتاً شدید نمایید.
- ۵- خلطی را که همراه با سرفه خارج می‌شود داخل ظرف مخصوص جمع آوری نمایید.
- ۶- جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده شدن سطوح خارجی ظرف خودداری نمایید.
- ۷- درب ظرف را محکم بسته و آن را هرچه زودتر به آزمایشگاه تحویل دهید.

توجه: نمونه خلط جهت تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی جمع آوری می‌گردد و چنانچه به جای آن نمونه ترشحات حلقی و دهانی (آب دهان) جمع آوری گردد، نتیجه مطلوب از این آزمایش حاصل نمی‌گردد.

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می‌گردد.