

شماره فرم : SCO-F-08

ویرایش : B

صفحه : ۱ از ۱

بخش نمونه گیری راهنمای بیمار جهت جمع آوری مدفوع چند نوبته



آزمایشگاه مرکزی فردیس
کلینیکال و اناتومیكال

سندبات سیستم کبیت ، هر گونه کپی و تکثیر از این سند سررا توسط دفتر بهبود کبیت و بهره وری انعام نخواهد شد

لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .

۱- ظرف پلاستیکی درب دار حاوی مایع نگهدارنده را در حالیکه دارای برچسب مشخصات می باشد از نمونه گیری تحویل گرفته و با خود به منزل ببرید . نمونه مدفوع را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمایید .

توجه : ظرف حاوی مایع نگهدارنده (فرمالین ۱۰٪) می باشد ، از دست زدن به آن و یا دور ریختن آن جداً خودداری نمایید. این مایع ، نگهدارنده تخم انگل ها و تک یاخته های روده ای است .

۲- هر روز در حدود ساعت معینی مقدار کمی مدفوع به اندازه فندق (حدود ۵ گرم) در ظرف ریخته شود و با استفاده از چوبک آنرا با مایع نگهدارنده خوب مخلوط نمایید و سپس چوبک را دور بیندازید .

۳- در طی یک روز نباید بیشتر از یک نوبت نمونه مدفوع از بیمار جمع آوری نمود .

۴- در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی مدفوع را در محل خنک نگهداری نمایید .

۵- جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن آن با آب خودداری نمایید . بر چسب روی ظرف باید تمیز باقی بماند تا مشخصات آن خوانا باشد .

۶- پس از اتمام نوبتهای نمونه گیری درب ظرف را محکم بسته و به آزمایشگاه تحویل دهید .

۷- چنانچه جهت انجام پرتونگاری (رادیوگرافی) باریم مصرف نموده اید و یا در حال مصرف آنتی بیوتیک تتراسیکلین هستید ، لطفاً نمونه برداری مدفوع را از ۷ روز بعد آغاز نمایید .

توجه : در صورتیکه نمونه مدفوع را جهت آزمایش خون مخفی (OB) جمع آوری می نمایید

توصیه می گردد جهت جلوگیری از کسب نتیجه مثبت کاذب به مدت ۳ روز قبل از نمونه گیری و در طی مدت نمونه گیری از مصرف گوشت و جگر و سبزیجاتی نظیر ترب ، تربچه ، کلم و قارچ و شلغم و داروهایی نظیر آسپرین با دوز بالا خودداری نمایید . همچنین برای اجتناب از نتایج منفی کاذب از مصرف ویتامین C خودداری نمایید .

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد .